


ANEXO: Equivalência entre as funções em Português e em inglês

Função		Descrição
Português	Inglês	
MODA	MODE	Devolve o valor que ocorre com mais frequência numa matriz ou intervalo de dados.
MED	MEDIAN	Devolve a mediana dos números indicados.
MÉDIA	AVERAGE	Retorna a média aritmética de um conjunto de argumentos, de valores.
QUARTIL OU QUARTIL.INC	QUARTILE OU QUARTILE.INC	Retorna o quartil do conjunto de dados. Depois de seleccionar os dados, é necessário indicar qual o quartil pretendido, de 0 a 4 
PERCENTIL OU PERCENTIL.INC	PERCENTILE OU PERCENTILE.INC	Permite calcular qualquer percentil de um conjunto de dados. É também a opção usada para indicar os decis. Depois de seleccionados os dados é necessário indicar a proporção pretendida dos dados, por exemplo. - Decil 7 equivale ao valor que acumula 0.7 dos dados; - Percentil 95 equivale ao valor que acumula 0.95 dos dados.
mínimo	MIN	Traduz o valor mínimo observado.
máximo	MAX	Traduz o valor máximo observado.
VAR ou VAR.S	VAR ou VAR.S	Calcula a variância amostral corrigida.
STDEV.S	STDEV.S	Calcula o desvio padrão amostral corrigido.