

Foi-nos dado que  $|\Delta x| \leq 0,2$ ,  $|\Delta y| \leq 0,2$  e  $|\Delta z| \leq 0,2$ . Para estimarmos o maior erro no volume, utilizamos, portanto,  $dx = 0,2$ ,  $dy = 0,2$  e  $dz = 0,2$  junto com  $x = 75$ ,  $y = 60$  e  $z = 40$ :

$$\Delta V \approx dV = (60)(40)(0,2) + (75)(40)(0,2) + (75)(60)(0,2) = 1980$$

Portanto, um erro de apenas 0,2 cm nas medidas de cada dimensão pode nos levar a um erro da ordem de 1.980 cm<sup>3</sup> no cálculo do volume! Isso pode parecer um erro muito grande, mas, na verdade, é um erro de apenas cerca de 1% do volume da caixa.

## 14.4 Exercícios

**1–6** Determine uma equação do plano tangente à superfície no ponto especificado.

1.  $z = 3y^2 - 2x^2 + x$ ,  $(2, -1, -3)$

2.  $z = 3(x - 1)^2 + 2(y + 3)^2 + 7$ ,  $(2, -2, 12)$

3.  $z = \sqrt{xy}$ ,  $(1, 1, 1)$

4.  $z = xe^{xy}$ ,  $(2, 0, 2)$

5.  $z = x \sin(x + y)$ ,  $(-1, 1, 0)$

6.  $z = \ln(x - 2y)$ ,  $(3, 1, 0)$

 **7–8** Desenhe a superfície e o plano tangente no ponto dado. (Escolha o domínio e o ponto de vista de modo a ver tanto a superfície quanto o plano tangente.) Em seguida, dê *zoom* até que a superfície e o plano tangente se tornem indistinguíveis.

7.  $z = x^2 + xy + 3y^2$ ,  $(1, 1, 5)$

8.  $z = \arctg(xy^2)$ ,  $(1, 1, \pi/4)$

 **9–10** Desenhe o gráfico de  $f$  e de seu plano tangente no ponto dado. (Utilize um sistema de computação algébrica tanto para calcular as derivadas parciais quanto para traçar os gráficos da função e de seu plano tangente.) Em seguida, dê *zoom* até que a superfície e o plano tangente se tornem indistinguíveis.

9.  $f(x, y) = \frac{xy \sin(x - y)}{1 + x^2 + y^2}$ ,  $(1, 1, 0)$

10.  $f(x, y) = e^{-xy/10}(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{xy})$ ,  $(1, 1, 3e^{-0,1})$

**11–16** Explique por que a função é diferenciável no ponto dado. A seguir, encontre a linearização  $L(x, y)$  da função naquele ponto.

11.  $f(x, y) = 1 + x \ln(xy - 5)$ ,  $(2, 3)$

12.  $f(x, y) = x^3y^4$ ,  $(1, 1)$

13.  $f(x, y) = \frac{x}{x + y}$ ,  $(2, 1)$

14.  $f(x, y) = \sqrt{x + e^{4y}}$ ,  $(3, 0)$

15.  $f(x, y) = e^{-xy} \cos y$ ,  $(\pi, 0)$

16.  $f(x, y) = y + \sin(x/y)$ ,  $(0, 3)$

**17–18** Verifique a aproximação linear em  $(0, 0)$ .

17.  $\frac{2x + 3}{4y + 1} \approx 3 + 2x - 12y$

18.  $\sqrt{y + \cos^2 x} \approx 1 + \frac{1}{2}y$

**19.** Dado que  $f$  é uma função diferenciável  $f(2, 5) = 6$ ,  $f_x(2, 5) = 1$  e  $f_y(2, 5) = -1$ , use uma aproximação linear para estimar  $f(2,2, 4,9)$ .

 **20.** Determine a aproximação linear da função  $f(x, y) = 1 - xy \cos \pi y$  em  $(1, 1)$  e use-a para aproximar o número  $f(1,02, 0,97)$ . Ilustre, traçando o gráfico de  $f$  e do plano tangente.

**21.** Determine a aproximação linear da função  $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  em  $(3, 2, 6)$  e use-a para aproximar o número  $\sqrt{(3,02)^2 + (1,97)^2 + (5,99)^2}$ .

**22.** A altura  $h$  de ondas em mar aberto depende da velocidade do vento  $v$  e do tempo  $t$  durante o qual o vento se manteve naquela intensidade. Os valores da função  $h = f(v, t)$  são apresentados na seguinte tabela. Use a tabela para determinar uma aproximação linear da função altura da onda quando  $v$  está próximo de 80 km/h e  $t$  está próximo de 20 horas. Em seguida, estime a altura das ondas quando está ventando por 24 horas a 84 km/h.

|                            |     | Duração (horas) |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|-----|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| Velocidade do vento (km/h) | $t$ | 5               | 10   | 15   | 20   | 30   | 40   | 50   |
|                            | 40  | 1,5             | 2,2  | 2,4  | 2,5  | 2,7  | 2,8  | 2,8  |
|                            | 60  | 2,8             | 4,0  | 4,9  | 5,2  | 5,5  | 5,8  | 5,9  |
|                            | 80  | 4,3             | 6,4  | 7,7  | 8,6  | 9,5  | 10,1 | 10,2 |
|                            | 100 | 5,8             | 8,9  | 11,0 | 12,2 | 13,8 | 14,7 | 15,3 |
|                            | 120 | 7,4             | 11,3 | 14,4 | 16,6 | 19,0 | 20,5 | 21,1 |

**23.** Utilize a tabela do Exemplo 3 para encontrar a aproximação linear da função humidex quando a temperatura está próxima de 32 °C e a umidade relativa do ar é de aproximadamente 65%. Estime também o humidex quando a temperatura é de 33 °C e a umidade relativa, 63%.

**24.** O índice de sensação térmica  $W$  é a temperatura sentida quando a temperatura real é  $T$  e a velocidade do vento,  $v$ . Portanto, podemos escrever  $W = f(T, v)$ . A tabela de valores a seguir foi extraída da Tabela 1 da Seção 14.1. Use essa tabela para determinar a aproximação linear da função de sensação térmica quando  $T$  estiver a  $-15$  °C e  $v$  estiver próximo de 50 km/h. Estime, a seguir, a sensação térmica quando a temperatura estiver a  $-17$  °C e a velocidade do vento for de 55 km/h.

 É necessário usar uma calculadora gráfica ou computador

 É necessário usar um sistema de computação algébrica

1. As Homework Hints estão disponíveis em [www.stewartcalculus.com](http://www.stewartcalculus.com)

|                       |                  | Velocidade do vento (km/h) |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Temperatura real (°C) | $T \backslash v$ | 20                         | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  |
|                       | -10              | -18                        | -20 | -21 | -22 | -23 | -23 |
|                       | -15              | -24                        | -26 | -27 | -29 | -30 | -30 |
|                       | -20              | -30                        | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 |
|                       | -25              | -37                        | -39 | -41 | -42 | -43 | -44 |

25–30 Determine a diferencial da função.

25.  $z = e^{-2x} \cos 2\pi t$       26.  $u = \sqrt{x^2 + 3y^2}$

27.  $m = p^5 q^3$       28.  $T = \frac{v}{1 + uvw}$

29.  $R = \alpha\beta^2 \cos \lambda$       30.  $L = xze^{-y^2-z^2}$

31. Se  $z = 5x^2 + y^2$  e  $(x, y)$  varia de  $(1, 2)$  a  $(1,05, 2,1)$ , compare os valores de  $\Delta z$  e  $dz$ .

32. Se  $z = x^2 - xy + 3y^2$  e  $(x, y)$  varia de  $(3, -1)$  a  $(2,96, -0,95)$ , compare os valores de  $\Delta z$  e  $dz$ .

33. O comprimento e a largura de um retângulo foram medidos como 30 cm e 24 cm, respectivamente, com um erro de medida de, no máximo, 0,1 cm. Utilize as diferenciais para estimar o erro máximo cometido no cálculo da área do retângulo.

34. Use diferenciais para estimar a quantidade de metal em uma lata cilíndrica fechada de 10 cm de altura e 4 cm de diâmetro se o metal das tampas de cima e de baixo possui 0,1 cm de espessura e o das laterais tem espessura de 0,05 cm.

35. Utilize diferenciais para estimar a quantidade de estanho em uma lata cilíndrica fechada com 8 cm de diâmetro e 12 cm de altura se a espessura da folha de estanho for de 0,04 cm.

36. O índice de sensação térmica é modelado pela função


$$W = 13,12 + 0,6215T - 11,37v^{0,16} + 0,3965Tv^{0,16}$$

onde  $T$  é a temperatura (em °C) e  $v$ , a velocidade do vento (em km/h). A velocidade do vento é medida como 26 km/h, com uma possibilidade de erro de  $\pm 2$  km/h, e a temperatura é medida como  $-11$  °C, com a possibilidade de erro de  $\pm 1$  °C. Utilize as diferenciais para estimar o erro máximo cometido no valor calculado de  $W$  em decorrência dos erros de medida em  $T$  e  $v$ .

37. A tensão  $T$  no cordel do ioiô na figura é

$$T = \frac{mgR}{2r^2 + R^2}$$

onde  $m$  é a massa do ioiô e  $g$  é a aceleração pela gravidade. Utilize as diferenciais para estimar a variação na tensão se  $R$  aumentar de 3 cm para 3,1 cm e  $r$  aumentar de 0,7 cm para 0,8 cm. A tensão aumenta ou decresce?



38. A pressão, o volume e a temperatura de um mol de um gás ideal estão relacionados pela equação  $PV = 8,31T$ , onde  $P$  é medida em quilopascals,  $V$  em litros e  $T$  em kelvins. Utilize diferenciais para determinar a variação aproximada da pressão se o volume aumenta de 12 L para 12,3 L e a temperatura decresce de 310 K para 305 K.

39. Se  $R$  é a resistência equivalente de três resistores conectados em paralelo, com resistências  $R_1$ ,  $R_2$  e  $R_3$ , então

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Se as resistências são medidas em ohms como  $R_1 = 25 \Omega$ ,  $R_2 = 40 \Omega$  e  $R_3 = 50 \Omega$ , com margem de erro de 0,5% em cada uma, estime o erro máximo no valor calculado de  $R$ .

40. Quatro números positivos, cada um menor que 50, são arredondados até a primeira casa decimal e depois multiplicados. Utilize diferenciais para estimar o máximo erro possível no cálculo do produto que pode resultar do arredondamento.

41. Um modelo para a área da superfície do corpo humano é dado por  $S = 72,09w^{0,425}h^{0,725}$ , onde  $w$  é o peso (em quilogramas),  $h$  é a altura (em centímetros) e  $S$  é medida em centímetros quadrados. Se os erros nas medidas de  $w$  e  $h$  forem no máximo de 2%, use diferenciais para estimar a porcentagem de erro máxima na área da superfície calculada.

42. Suponha que você precise saber uma equação do plano tangente à superfície  $S$  no ponto  $P(2, 1, 3)$ . Você não tem uma equação para  $S$ , mas sabe que as curvas

$$\mathbf{r}_1(t) = \langle 2 + 3t, 1 - t^2, 3 - 4t + t^2 \rangle$$

$$\mathbf{r}_2(u) = \langle 1 + u^2, 2u^3 - 1, 2u + 1 \rangle$$

ambas estão em  $S$ . Encontre uma equação para o plano tangente em  $P$ .

43–44 Mostre que a função é diferenciável achando valores de  $\varepsilon_1$  e  $\varepsilon_2$  que satisfaçam à Definição 7.

43.  $f(x, y) = x^2 + y^2$

44.  $f(x, y) = xy - 5y^2$

45. Demonstre que se  $f$  é uma função de duas variáveis diferenciáveis em  $(a, b)$ , então  $f$  é contínua em  $(a, b)$ .

Dica: Mostre que

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} f(a + \Delta x, b + \Delta y) = f(a, b)$$

46. (a) A função

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

foi representada em um gráfico na Figura 4. Mostre que  $f_x(0, 0)$  e  $f_y(0, 0)$  existem, mas  $f$  não é diferenciável em  $(0, 0)$ . [Dica: Utilize o resultado do Exercício 45.]

(b) Explique por que  $f_x$  e  $f_y$  não são contínuas em  $(0, 0)$ .